

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

ZOVIRAX Crema Aciclovir

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

- 1. Qué es ZOVIRAX y para qué se utiliza**
- 2. Antes de usar ZOVIRAX**
- 3. Cómo usar ZOVIRAX**
- 4. Posibles efectos adversos**
- 5. Conservación de ZOVIRAX**
- 6. Información adicional**

1. QUÉ ES ZOVIRAX Y PARA QUÉ SE UTILIZA

ZOVIRAX pertenece al grupo de medicamentos llamados antivirales.

ZOVIRAX está indicado para el tratamiento de infecciones de la piel producidas por el virus del herpes simple incluyendo herpes genital inicial y sus recaídas y herpes labial.

2. ANTES DE USAR ZOVIRAX

No use ZOVIRAX

En caso de haber experimentado previamente una reacción alérgica a aciclovir, valaciclovir, propilenglicol o a cualquier otro componente de ZOVIRAX.

Tenga especial cuidado con ZOVIRAX

No se recomienda el uso cutáneo de aciclovir en membranas mucosas como en caso de la boca, ojo o vagina ya que puede ser irritante. Se debe tener especial cuidado para evitar la introducción accidental en el ojo.

Si las recaídas son frecuentes, consulte con su médico para que decida si debe cambiar a una presentación de administración oral.

Toma o uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han descrito.

3. CÓMO USAR ZOVIRAX

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde usar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con ZOVIRAX. No suspenda el tratamiento antes ya que podría volver a aparecer la infección producida por el virus.

Adultos y niños: ZOVIRAX se debe aplicar cinco veces al día, aproximadamente cada cuatro horas omitiendo la aplicación de la noche.

ZOVIRAX debe aplicarse en las lesiones o en las lesiones inminentes lo antes posible tras el comienzo de la infección. Es importante comenzar el tratamiento de los episodios recurrentes durante el periodo durante el cual todavía no han aparecido las lesiones o cuando las lesiones aparecen por primera vez.

Se debe continuar el tratamiento durante 5 días. Si no se ha producido la curación en 5 días, el tratamiento puede prolongarse durante 5 días más hasta un total de 10 días.

ZOVIRAX contiene una base especialmente formulada y no se debe diluir o utilizar como base para la incorporación de otros medicamentos.

Tras la aplicación de ZOVIRAX se deben lavar las manos para evitar la diseminación a otras zonas del cuerpo o el contagio de otras personas.

Si estima que la acción de ZOVIRAX es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si usa más ZOVIRAX del que debiera

Si ha utilizado ZOVIRAX más de lo que debe o ha ingerido accidentalmente el contenido del tubo, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

Si olvidó usar ZOVIRAX

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente continúe con el tratamiento habitual tan pronto como sea posible.

No debe sobrepasarse la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, ZOVIRAX puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Poco frecuentes (menos de 1 por cada 100 pero igual o más de 1 por cada 1.000 pacientes):

- Quemazón o picazón pasajeros tras la aplicación de ZOVIRAX Crema
- Leve sequedad o descamación de la piel

- Sensación de picor

Raros (menos de 1 por cada 1.000 pero igual o más de 1 por cada 10.000 pacientes):

- Erupción de la piel
- Dermatitis de contacto tras la aplicación

Muy Raros (menos de 1 por cada 10.000 pacientes):

- Reacciones de hipersensibilidad inmediata incluyendo hinchazón (de párpados, cara, labios, boca o lengua)

5. CONSERVACIÓN DE ZOVIRAX

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25°C. No refrigerar.

No utilice ZOVIRAX después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de ZOVIRAX

Cada gramo de crema contiene:

Aciclovir..... 50 miligramos

Los demás componentes son: poloxámero 407, alcohol cetosteárico, laurilsulfato de sodio, parafina blanca blanda, parafina líquida, propilenglicol, dimeticona 20, arlancel 165 y agua purificada c.s.

Aspecto del producto y contenido del envase

ZOVIRAX se presenta en forma de crema

Presentaciones en tubos de 2, 10 y 15 gramos.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación

Titular de la autorización de comercialización:

GlaxoSmithKline, S.A.
Parque Tecnológico de Madrid
C/ Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos
Madrid

Responsable de la fabricación:

Glaxo Wellcome Operations
Barnard Castle
Reino Unido.

Este prospecto ha sido aprobado en Octubre 2007